



โรคไข้เลือดออก



ภัยร้ายจากยุง



โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มีอยู่หลาย
เป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มักเกิดใน
ช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก

อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน 39-40 °C
หน้าแดง มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ

มีอาการเลือดออก เลือดกำเดาไหล

มีผื่น/จุดเลือดตามตัว ถ่ายดำ

อาเจียนเป็นเลือด



ตับโต

กดเจ็บใต้ชายโครงด้านขวา



ภาวะช็อค มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
ปวดท้องหนักมาก กระสับกระส่าย
ซึม มือเท้าเย็น ความดันต่ำ



การรักษา



หากมีไข้ให้ทานยาลดไข้
(พาราเซตามอล)

ห้ามใช้ยาแอสไพริน



ดื่มน้ำมาก ๆ หรือดื่ม
เกลือแร่แทนน้ำเปล่า



หากมีอาการปวดท้อง ชิม
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด **ต้องนำส่ง**
โรงพยาบาลทันที

การป้องกัน



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัด
ภาชนะที่มีน้ำขังหรือปิดฝาให้สนิท
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาด



ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง
หรือติดมุ้งลวดในบ้าน
ทายากันยุง



หากมีอาการนำส่งสัยควร
รีบพบแพทย์