


ไข้เลือดออก กับ สตรีตั้งครรภ์



โรคไข้เลือดออกมักพบการระบาดในช่วงฤดูฝน จึงมีความจำเป็นที่ต้องระมัดระวัง การติดเชื้อไข้เลือดออก เพราะในผู้ป่วยบางรายโรคนี้อาจมีความรุนแรงถึงชีวิตได้ ซึ่งเด็กและสตรีตั้งครรภ์ก็จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงของโรคสูง

สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก ไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงของตัวเองเท่านั้น เชื้อยังอาจผ่านรกไปยังทารกในครรภ์ และทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ คลอดก่อนกำหนด หรือเสียชีวิตในครรภ์ได้ แต่ไมได้ไปทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดของการรก

การป้องกัน
การติดเชื้อ
ไข้เลือดออก

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่
ที่ค้ำคมีไข้เลือดออกระบาด

พยายามป้องกันตัวเองจากการ
ถูกยุงลายกัด ได้แก่

- การสวมเสื้อผ้ามิดชิด
- การมีมุ้งคลุมหรือมุ้งป้องกันยุง
- การทาสารกันยุงที่ปลอดภัย
- การทำลายแหล่งน้ำสกปรกต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

การทำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด

ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา (ZIKA) ซึ่งมีผลเสียร้ายแรงต่อการรกในครรภ์อีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ที่มา : รศ. นพ.สมชาย อนุวัฒนาเจริญ



@chulohospital



Chulalongkornhospital



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สมมติฐาน



02-256-8000 ต่อ 0

โรคติดเชื่อไวรัสซิกา



โรคติดเชื่อไวรัสซิกา (Zika Fever) มีขุลงลาย
เป็นพาหะนำโรค เป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายที่
ส่งผลต่อระบบสมองโดยเฉพาะเด็กในครรภ์
เมื่อได้รับเชื้ออาจรุนแรงถึงขั้นสมองผิดปกติ
เช่น สมองเล็ก แคระแกร็น พัฒนาการช้า
ตัวเล็กผิดปกติ

อาการ

ปวดศีรษะ
เยื่อตาอักเสบ
มีไข้อ่อนเพลีย

มีผื่นแดง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ



การป้องกัน

กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใช้วิธี 3 เก็บ 3 โรค
ได้แก่ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

