



โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึมลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

อาการ

1.



ไข้สูงเฉียบพลัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน

2.



มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ

3.



มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว

4.



ตับโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
นำส่งสัควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



ด้วยความปราณนาดีจาก....เทศบาลตำบลบางลึก....



การป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยใช้มาตรการ 5ป. 1ข.

ปิด



ปิดฝาภาชนะให้สนิท

ปล่อย



ปล่อยปลากินลูกน้ำ

เปลี่ยน



เปลี่ยนน้ำในภาชนะ
ที่ปิดไม่ได้

ปรับ



ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย

ปฏิบัติ



ปฏิบัติเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ขีด



ขีดล้างไข่
ในภาชนะที่มีน้ำขัง
เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย

💡 ด้วยความปรารถนาดีจาก...เทศบาลตำบลบางลึก...